



QUÆSTIO MEDICA,
PRO BACCALAUREATU.
MANE DISCUTIENDA.

In Almâ Monspeliensium Medicorum Academiâ.

PRÆSIDE

R. D. FRANCISCO CHICOYNEAU
Regis Consiliario & Medico, nec-non Pro-
fessore Anatomico & Botanico, Cancellario
Amplissimo & iudice æquissimo.

An lvi Venereæ Frictiones Mercuriales.

I.



U E S venerea, turpis morbus, fœda proles impuræ veneris, sæviens & infestus hominis luxuriosi hostis; qui nullo hæc-
nùs thure pacatus, multos plectit, paucis indulget, omnes
indiscriminatim aggreditur & æquo pede pulsat divitum turres
pauperumque tabernas, qui quos semel aggressus est, nusquam
in posterum plerumque deserit, nec filiis ipsorum nequaquam
sæpius parcit & mala largitur vitæ stamina.

Hæc infesta labes variis temporibus pro diversis aucthoribus orta assigna-
tur. Ex his enim irrepsit apud *Neapolim*, primùm in *Gallorum* exercitum. Ex

illis vero *Europam* appulit ex *India Occidentali* cum ante id tempus, nequidem nomine tenus, quantum illis scire licet nostro orbi innotuerit; unde etiam morbus vulgò censetur iis tractibus *America* endemius, in quos nos primi colonias deduximus. Aliis potius è regione aliqua *Nigritarum Guinea* conterminorum originem traxisse videtur; cum à plurimis iisque fide dignis didicerint mancipia recens à *Guinea* allata, etiam antequam in terram descenderint, hoc morbo tentari, nullâ impurâ copulâ prægressâ, ita ut non raro universam eorum familiam viros scilicet, mulieres liberosque malè mulctet: probabile itaque illis videtur *Hispanos* qui primi in *Europam* hunc morbum traduxere, eodem infectos fuisse ex contagio *Nigrorum* emptorum in *Affrica*, quorum genti alicui endemius esse potest; multi enim sunt populi *Guinea* confines apud quos invaluit mos ille Barbarus homines *Europæis* mercibus permutandi. Probabilius verum existimo luem veneram longè ante illud tempus hominibus innotuisse, cum de quopiam seminis profluvio loquatur *Moyse* in *Levit.* & *Herodot.* in *Lib. 3. Histor.*

Sed ut ut sit, certum est contagiosam istam luem paulatim serpentem per decimum quintum & decimum sextum sæculum has orbis terrarum partes eò usque inquinasse, ut si eâ celeritate grassaretur adhuc, quâ primum invasit, intra sæcula aliquot actum esset de genere humano vel saltem prorsus impar esset iis rebus gerendis quibus continetur humana societas, nisi quod vegetabilium iustar, in alienum à patrio solum quasi transplantata *europæo* nostro non perindè lætatur, sed languet in dies & mitioribus phœnomenis fatiscit; novus apud nos hospes cum esset, si quem arripuerat mox omnem sanguinis massam contaminabat & diris capitis atque artuum doloribus, tum etiam ulceribus variis in partibus se prodebat: at verò *Centum quinquaginta* retrò *Annis Gonorrhœa* virulentæ speciei se primum ostendebat, ostenditque sæpius adhuc; hac sibi portâ exitum quærens, nullo alio manifesto symptomate, nisi quod in perpauca ulcusculum in pudendo (*Vulgò cancer*) primum est morbi indicium, cujus virus cum per *Gonorrhœam* non ejiciatur sanguinis massam dicto citius pervadit inficitque; Unde diris capitis atque artuum dolores, macula rubra, porrigines, bubones, ulcera, cancri, exostoses & alia id genus: ut novus *Prothæus* depingi possit, qui medico fingit crucem inter detegendum.

I I.

DIXIMUS hætenus de luis origine & eam accuratè descripsimus. Jam de efficiente causa, cujus ad curationem in primis est necessaria cognitio, accuratiùs differendum. Hæc levis admodum & ferè corporis experts sensusque nostros effugiens, maximè à *Neotericis* agitata fuit; at nondum tamen definita quæstio est. Odiosas illorum concertationes enarrare & longiùs & nimis arduum foret, nostras itaque lucubrationes pro virili illustrare meliùs decet; nostras dico non quod à nobis inventæ aut primò excogitatæ fuerint, sed quod illas nos quoque sequimur. Absit enim aliorum inventa & laborem falsò nobis arrogare: si meliora excogitassetus meliora tradere-

mus: sed acidum quod cum plerisque causam hujus mali efficientem arguimus, non est sal fictum & in ceruice nostra tantummodò existens, sed sal operationibus Chymicis ex saliva hominis ptyalismo affecti elicatum, ex multorum observationibus cum Alkalinis & sulphureis fermentescens, variis luis venereæ symptomatibus exponendis apprimè quadrans, corrosivum & humores coagulans sicut spiritus nitri & alii spiritus acidiores: ex qua proprietatum concordia, ritè, me herculè, deduci debet naturæ conformitas.

Ab iis salibus, cum malum jam cerebrum summamque corporis arcem obsidet, multam supervacuum, pro partis conditione, serositatem ex sanguine coagulato exprimi & colligi necesse est: quæ si interclusa capite contineatur, magnum & acerbum dolorem meninges distendendo commovet. Sin verò sub cutim capitis promineat vel in articulos vel artus deturbetur, cruciatus excitat immanes & diuturnos, qui noctù maximè ingravescunt ob serositatum majorem stagnationem & maximam ideò partium divulsionem. Quod si serositas coaguletur & de novo affluat, partes elevari & obdurescere, sive bubones præduros, si in glandulis id eveniat, schirrososque tumores, haud quaquam tamen doloris expertes, progigni necessum est; si verò jam acrior facta dictas partes corrodat, *Cancros* inducit. Si sub ossium membranas se recondat, tum acrimoniâ, tum distensione dolorem excitat: In ossium vero substantiam per tenues quasi tubos sese inferens, illa diffundit dilatatque in tumorem, *Exostosem*, dictum, quæ tandem carie consumpta putrescunt. Si minus acris materia cutim non exedit, ad pilorum radices effusa succo nutritio viam intercipit effluviumque concitat: quo plerique visi sunt sine capillis, qui postea repullularunt. Cur lues in his facilius, in illis tardiùs manifestetur, detegere arduum est: qui tamen illud discrimen tum in diversa sanguinis compage aut rariori aut densiori, tum in energia & motu virùs venerei plùs minùsve vel aucto vel imminuto positum esse autumabit, nodum difficultatis quadantenùs attinget.

Propagatur autem hæc infesta labes, vel per generationem, unde misellus infans ab inquinato parentum altero mala ducit vitæ stamina: vel per contactum mollioris alicujus partis quo virulentia atque inflammatio corpori insinuantur ex occasionibus hoc in loco dicendis. Primò in lactatione v. g. vel infans nutricem per rariores mamillarum poros, vel nutrix infantem per os tenerum inficere potest. Secundò infantes si nudi cum inquinatis in eodem lecto dormiant. Licet enim adulti quorum caro jam firmior ætate obdaruit, vix nisi intercedente impuro coïtu, quamvis simul dormiant, possint infici: infantium tamen laxior caro & texturæ rarioris venenum facile excipit. Tertiò autem partis mollioris contactus maximè in coïtu impuro fit; ac proinde eo ut plurimum modo serpit lues; cum scilicet penis spiritibus generationi dicatis turgidus & apertior subindè factus, à venereo sive ulcere sive etiam pustulâ in uteri vagina stabulante, noxam de facili haurit; quorum alterutro intùs latente, mulier nihilominùs sana videri potest; veneno nempe vel istarum partium illuyie ita detento, ut segniùs in-

vadant sanguinem: vel per menstruas purgationes diluto sæpius & quadam
 tenus exterminato.

III.

CONTAGIO hæc per urethram in glandulas prostates penetrans,
 & humorem in illis contentum inquinans, ipsas efferato ulcerè solet
 depascere, efficitque ut sanies qualem in *Gonorrhœa* cernimus in urethram
 lentè extillet; quod haud rarò cernitur in eorum cadaveribus quos hic
 morbus è medio sustulit.

Æger (ocys aut seriùs prout mulier cum qua coïvit magis minùsve fue-
 rit inquinata, pro ratione etiam temperaturæ magis minùsve veneno exci-
 piendo idoneæ) primùm dolore genitalium cruciatur cum quadam rotatione
 quasi testiculorum; postea liquor quidam lentè extillat seminis instar, qui
 quotidie à semine tam colore quam consistentiâ recedens flavescit tandem
 aliquantò dilutiùs ovi vitello & in gonorrhœa virulentiore intensioreque
 non modò virescit, sed & aqueo humore permiscetur sanguine affatim tincto.
 Hanc alia mox symptomata excipiunt, ut primò magnus doloris sensus in
 pene quando erigitur, qui noctù præcipuè urget, quoties in lecto æger cœ-
 pit incalescere quam quidem constrictionem penis dolorificam morbi hujus
 in hoc statu existentis signum pathognomonicum existimo. Accedit etiam
 ardor urinæ, qui plerumque inter mingendum vix percipitur, at verò æger
 jam à mictu cessans per omnem urethræ ductum acriter admodum uritur,
 maximè quâ parte in glandem desinit: incurvatur etiam à fræno jam con-
 tractiore, quod cum in erectione extenditur, pro natura sua acutissimum
 dolorem infert.

Nonnunquam etiam erosâ atque excoriatâ urethrâ jugi puris acrioris fluxu,
 natura in carne novâ vice jam deperditæ justò occupatio laxam quandam
 & spongiosam substituit, quæ mole quotidie auctâ & sensim induratâ ca-
 runcularum excrescentiis ita meatum urinarium infarcit, ut tandem lotio non
 detur exitus: quæ quidem carunculæ nihilominùs ex ulceribus sibi adnatis
 ichorem quemdam eyomunt, & tum medico crucem figunt inter curandum,
 tum ægro magis ipsâ morte timendum malum. Quin imò sæpè accidit ut
 sanies quæ per gonorrhœam deplenda erat vel à motu vehementiori vel
 adstringentium usu immoderato in scrotum deposita, atrocissimum dolorem
 & scroti inflammationem accersat, nunc alterutro, nunc utroque ejus latere
 in molem ingentem elato. Atque hæc sunt communiora morbi hujus symp-
 tomata, manente hoc ejus statu.

At vero quoties sive morbi diuturnitate & in dictis partibus morâ
 contagio sursùm fertur & sensim sanguini labem imprimit aut materia viru-
 lenta urethræ viam minimè sequens, vel indebito adstringentium usu in
 corpore retenta humores corrumpit & infestat, vera lues exoritur; in qua
 tumores sive *bubones* in inguine apparentes primùm plerumque ejus gradum con-
 stituunt. Dolores tum caput tum artus in articulorum interstitiis, humeros

scilicet, brachia & talos crudeliter laniant, nullo ordine invadentes & per intervalla; licet noctū ægrum calore lectuli perfusum rarissimè destituant, nec nisi sub aurora libenter evanescant. Crustulæ etiam & porrigines varias corporis partes deturpant, flavescunt hæ fermè ad instar favi, quo signo à cæteris morbis queant internosci: quandoque superficie latiore varia occupant corporis spatia ad eum modum quo lepra in medicorum scriptis depingitur: Quotò autem magis scabies hæc diffunditur, tantò minus æger discruciat. Universa symptomata pedetentim incrudescunt, dolor præ reliquis qui tandem eò usque exacerbatur ut se nequeat miser diutiùs in lecto continere, sed protinùs exiliens hùc illùc cursitet in cubiculo irrequietus fermè donec illuscescat. Demùm præ succi acidi stagnatione, coagulatione & acrimoniâ cranium atque ossa tiliarum brachiorumque hinc inde attolluntur in perdura tubera, *exostoses* dicta: quæ quidem ossa tuberculis obsessa acrimoniâ tandem cariola redduntur & putrescunt. Ulcera etiam *Phagadenica* varias corporis partes depopulantur, quæ fauces ut plurimùm primò aggredientia, sensim per palatum in nasi cartilaginem propagantur, quem mox absumunt: ità ut is jam fulcro destitutus planè concidat. Crescentibus in dies ulceribus & dolore aucto, æger partim indefinente carnicinâ enectus, partim ulceribus confectus & putredine, vitam trahit cruciatu, fœtore, carie, opprobrio molestissimam & ipsâ morte, longo intervallo miseriosem: donec tandem, pereuntibus per vices membris, lacerum cadaver & jam superis grave humo condatur.

Ex signis supra allatis hic morbus facilè innotescet, illum verò detegere paulò difficiliùs censetur, cum pauca tantum ex allatis symptomatis videre est: At longè difficillimum cum aliarum affectionum symptoma mentitur: cum nempe adsunt ophthalmiæ, surditas, aurium tinnitus, cæcitas, vertigo &c. Tunc enim consulendus est sagaci & acerrimo iudicio pollens medicus, qui malum detegat, qui de morbis præteritis ægrum interroget, qui quærat an *Gonorrhœa* ille, an *Bubonibus* aliquandò affectus fuerit, & quibus usus est remediis: hæc ratione quo in loco incidias posuerit hostis callidissimus & infensissimus solertem medicum non fugiet.

I V.

CONTUMAX est hic affectus cuncta, unico excepto eludens pharmaca & immaniter admodum ferociens mortemque nisi præcaveatur in posterum afferens. Ad tempus post curationem plerumque evanescit non penitus tamen, recrudescit enim aliquandò, quamvis ut plurimùm non ad eò diris symptomatibus stipetur; mulieribus minùs infestus quam viris, longiùs à primis protrahitur. Qui sulphureum & crassum sanguinem obtinent, in illis lues tardiùs manifestatur, sed curatur difficiliùs: qui verò sanguine volatili & salino sunt præditi, in his priùs apparet, sed faciliùs tollitur.

qui copiosissimâ transpiratione donantur, ii difficilùs lue venereâ laborant : qui gonorrhœâ laborarunt in juventute ; solent in senectute diro urinæ ardore vexari. Corpus humectare potius quam siccare convenit. Crustulæ copiosiores & flavæ, sudor acidum redolens & urinæ copiosiores & flavæ bonæ ; Alvi fluxus diuturnior, tussis & dolor capitis, malum : metus enim est ne fiat illarum partium exulceratio.

V.

AD curationem quod attinet de gonorrhœa primò agemus : Curatur enim modo prorsùs diverso ac lues propriè dicta. Ad id maximè conducunt cathartica quorum auxilio ejicitur humor peccans : ad temperandam insuper inflammationem & mitigandum ardorem urinæ, emulsionem quamdam ex seminibus frigidis cum syrupo nympheæ componere non erit abs re ; neque malum est quovis hujus morbi tempore sanguinem detrahere, si tumor præsertim & vehementia doloris id suadeant. Procedente curatione quâcumque demum methodo tentetur æger cibus omnibus salè conditis, vel aliàs dyspeptis abstineat : vino in genere abdicato, vel saltem parcius propinato. Alvus constipata clysteribus, herbis emollientibus, ptyisanâque laxante solvenda: ad id nihil meliùs conducit quam cyathus lactis expressi manè quotidie propinatus ; temperat enim & alvum laxat. Atque hæc hætenùs de gonorrhœa.

Cùm verò eò usque invaluerit morbus, ut jam venerea lues vel lues confirmata dici mereatur alia omnino via quærenda est : quandòquidem nullum adhuc experimentum afferri possit extirpati meliùs hujusce mali nisi per salivationem ab hydrargiro excitatam : quidquid tam doctorum nonnulli quam indoctorum de aliis sanandi modis satis temerè & audacter effutiverint. Cùm itaque omnem hîc numerum absolvat, id tantùm mihi incumbit, ut quæ in ea excitanda tum etiam regenda apta nata sunt edisseram.

In principio autem corpus præparandum catharticis & digerentibus, balneo puta : ut de venæ sectione jam taceam cui nonnulli hic loci primas deferunt. Balneis itaque sufficienter adhibitis unguentum præscribendum est ex axungia porcina ℥ij. & mercurii crudi ac therebentinâ extincti ℥i. & quartâ parte dicti unguenti inungendæ primò ægri tibiæ, secundò crura & inguina, tertio spina dorsi & axillæ, ita tamen ut neque pectus neque abdomen attingat uspiam, quartò demùm brachia. Post quartam inunctionem gingivæ ut plurimum intumescunt & ptyalismus suboritur : si verò intra quatuor dies post ultimam inunctionem idem haud procedat, ter quaterve adhuc parcâ manu inunctiones repeti possunt, si antea non oboriatur salivatio : sin fiat nova methodus aggredienda. Ubi primum expuere inceperit id jam medico negotii tantum est ut gradum salivationis scrupu-

losè expendat, ne invocatis temerè suppetiis, salivationem eòusque evehat ut æger de vita periclitetur. Verùm ubi ptyalismus ad decimum quartum diem pervenerit; purgatione, venæ sectione & clysteribus avertendus ac ægro linthea indusiaque permutanda; alioquin enim magis quam erat opus intendere salivationem & longiùs protrahere apta nata sunt. Quod si fortè priùs elanguescat salivatio quam symptomata penitùs evanuerint, exstimulanda subinde mercurio dulci ad ℞i. vel panaceâ ad ℞β. pro dosi exhibitis.

OBSERVANDUM quod si tumor ossi alicui, *Exostosis* vulgò dictus, infideat, qui etiam tandiù permanferit ut os jam carie afficiatur incassum prorsùs erit sive salivatione sive aliâ quacumque methodo curationem aggredi, nisi etiam huic malo obviam èatur ac proindè os ope caustici vel alio quovis instrumento denudandum & exfoliandum aut callum producendum ope scilicet remediorum quæ intentionem hanc implere solent. In ore exulcerato, quod salivationem passis ita familiare est, si æger dolori ferendo par non sit vel os eò usque excorietur ut sanguine diffluat, idem nocte dieque lacte primùm aquæ permixto, dein vino cum aqua & vino postea puro sæpissimè proluendum est. Diceta & reliquum ægri regimen eadem ac in catharsi imperanda, ut scilicet se in cubiculo à vi frigoris deffendat æger & diætâ tenui moderatè utatur, temperatam quoque regionem eligat.

Dicta methodus uti expeditior est, ita faciliior, minus itidem periculosa & minus recidivæ obnoxia; cui etiam ratio adstipulatur, mercurius enim ob ipsiusmet ingens pondus & globosam figuram corpus summè movens, per frictiones ad motum aptior & facilius sanguini insinuatur, quem dicto citiùs fundit & attenuat. Hic simul cum sanguine in universum corpus delatus, simul etiam cum saliva in glandulis oris transmittitur: ubi salivæ salibus onustus (experientiâ enim compertum est salivam ad mercurium fixandum maximè pollere) vasa glandularum excretoria, ob auctam à salibus massam, nequit permeare: & continuò affluens ibique quasi carceratus tumorem primò inter vasorum interstitia, ulcus deindè extra glandulas effusus efficit; per quod saliva & serositates attritæ venereisque onustæ acidis & continuò affluentes effunduntur & cum ipsis virus venereum. Unde jure concludo,

E R G O

Lui venereæ frictiones Mercuriales.

Propugnabit in Augustissimo Monspeliensis Apollinis fano **LUDOVICUS BOUHIER DE L'ECLUSE** Sabulonæus, Apud **PICTONES** Artium Liberalium Magister & jam dudum Medicinæ Studiosus die mensis Septembris anni 1711.

